

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第5号

令和5年(2023年)11月7日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲バイ水温	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6
10年平均値	20.7	20.6	20.3	20.1	20.0
R5年度	21.5	21.6	21.9	22.2	22.0

分析:熊本県水産研究センター
 協力:熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 15:31					参考:窒素量		備考	
			窒素量	リン量	水温	比重	珪藻類	採水	10年平均値※ (11月上旬)		第4号 (10/31)
			μg・at/L	μg・at/L	°C	(ρ 15)	cells/ml				
有明海	荒尾	支柱	5.8	1.0	21.9	23.2	6	11/6	14:00	6.8	6.3
		ベタ	欠測	-	-	-	-		-	7.2	2.6
	熊本北部	支柱	欠測	-	-	-	-		-	6.9	7.7
		ベタ	欠測	-	-	-	-		-	9.1	6.0
	岱明	支柱	欠測	-	-	-	-		-	6.6	5.8
		ベタ	欠測	-	-	-	-		-	6.6	3.5
	大浜	支柱	欠測	-	-	-	-		-	10.2	10.6
		ベタ	欠測	-	-	-	-		-	5.2	4.6
	河内	支柱	1.1	0.0	21.5	23.5	2,900		16:00	14.5	15.0
		ベタ	0.4	0.0	21.5	23.3	1,900		16:00	9.6	3.9
	沖新	支柱	欠測	-	-	-	-		-	4.8	7.5
		ベタ	欠測	-	-	-	-		-	3.3	3.4
	島口	支柱	欠測	-	-	-	-		-	6.2	13.5
		ベタ	欠測	-	-	-	-		-	4.8	3.7
網田	支柱	4.9	0.4	22.1	23.7	42	11/5	14:00	10.6	8.0	
	ベタ	7.6	0.7	21.4	23.8	17		14:00	5.8	3.6	
平均	支柱	3.9	0.5	21.8	23.5	/	/	/	8.3	9.3	
	ベタ	4.0	0.4	21.5	23.5	/	/	/	6.4	3.9	
	全体	4.0	0.4	21.7	23.5	/	/	/	7.4	6.6	
八代海	三角	支柱	欠測	-	-	-	11/6	欠測	5.8	0.8	
	平均	全体	/	/	/	/	/	/	5.8	0.8	
熊本県	平均	支柱	3.9	0.5	21.8	23.5	/	/	/	8.0	8.3
		ベタ	4.0	0.4	21.5	23.5	/	/	/	6.4	3.9
		全体	4.0	0.4	21.7	23.5	/	/	/	7.3	6.3

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類：アステリオネロプシス属、タリシオラ属等

※10年平均値は平成25年度から令和4年度の旬別平均とする。
 ただし、沖新は令和3年度からのため、2年平均とする。

