

性感染症の発生状況(8月分)

(県内16観測医の報告分)

| 疾病名 | 報告数 | 発生状況 |
|---------------|------------|---|
| 性器クラミジア感染症 | 54 (49) | 報告数54件(前月比1.1、前年比1.1)でした。前月比、前年比とも僅かに増加しています。男女別は、女性が37件と多く見られています。年齢別は、女性は20～29歳に22件と多く、男性では20～24歳に5件と多く見られています。地区別は、熊本42件と圧倒的に多く、次いで有明4件、宇城に3件、菊池、八代に各2件、御船1件でした。 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 17 (16) | 報告数17件(前月比1.1、前年比0.9)でした。前月比では僅かに増加、前年比では僅かに減少しています。男女別は、女性が10件と多く、年齢別では、女性では20～64歳、男性でも25～64歳と幅広く見られています。地区別は、熊本が10件と圧倒的に多く、次いで八代4件、菊池2件、宇城1件でした。 |
| 尖圭コンジローマ | 4 (11) | 報告数は4件(前月比0.4、前年比1.3)でした。前月比では減少、前年比では増加しています。男女別は、男女2件と同数でした。年齢別は、男性では25～34歳に、女性では25～29歳、35～39歳に各1件見られています。地区別は、4件とも熊本でした。 |
| 淋菌感染症 | 19 (17) | 報告数は19件(前月比1.1、前年比1.3)でした。前月比、前年比とも増加しています。男女別は、男性に13件と多く見られています。年齢別は、男性は15～24歳に7件、30～44歳に6件、女性では15～54歳に幅広く見られています。地区別は、熊本14件、有明、宇城に各2件、八代1件でした。 |

※()内数値は前月報告数

※報告数は県内16箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんのでご注意ください。

※性感染症について

| | |
|---------------|---|
| 性器クラミジア感染症 | 潜伏期間は1～3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 潜伏期間は2～10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発することが多い。 |
| 尖圭コンジローマ | 潜伏期間は数週間～数か月。性器や肛門などにいぼ状の腫瘍ができる。 |
| 淋菌感染症 | 潜伏期間は3～10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性では、男性に比べて症状があまりないことが多い。 |

※STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。

⇒ [熊本県のホームページ「エイズってなあに」](#)を是非ご覧ください。

(「熊本県のホームページ」→県庁の組織でさがす→『健康福祉部』健康危機管理課→『エイズ関連』カテゴリー内「エイズってなあに」)

性感染症の発生状況(8月)

(県内16観測医の報告分)

保健所別発生状況

| 区 分 | | 合計 | 熊本 | 山鹿 | 菊池 | 阿蘇 | 御船 | 八代 | 水俣 | 人吉 | 有明 | 宇城 | 天草 |
|-------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 性器クラミジア 感染症 | 男 | 17 | 11 | * | | * | | 1 | * | | 2 | 3 | |
| | 女 | 37 | 31 | * | 2 | * | 1 | 1 | * | | 2 | | |
| | 計 | 54 | 42 | * | 2 | * | 1 | 2 | * | | 4 | 3 | |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 男 | 7 | 5 | * | | * | | 1 | * | | | 1 | |
| | 女 | 10 | 5 | * | 2 | * | | 3 | * | | | | |
| | 計 | 17 | 10 | * | 2 | * | | 4 | * | | | 1 | |
| 尖圭コンジロー マ | 男 | 2 | 2 | * | | * | | | * | | | | |
| | 女 | 2 | 2 | * | | * | | | * | | | | |
| | 計 | 4 | 4 | * | | * | | | * | | | | |
| 淋菌感染症 | 男 | 13 | 9 | * | | * | | 1 | * | | 1 | 2 | |
| | 女 | 6 | 5 | * | | * | | | * | | 1 | | |
| | 計 | 19 | 14 | * | | * | | 1 | * | | 2 | 2 | |
| 計 | 男 | 39 | 27 | | 0 | | 0 | 3 | | 0 | 3 | 6 | 0 |
| | 女 | 55 | 43 | | 4 | | 1 | 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | 計 | 94 | 70 | | 4 | | 1 | 7 | | 0 | 6 | 6 | 0 |

*は、定点がない地区

年齢別発生状況

| 区 分 | | 合計 | 0~ 14 | 15~ 19 | 20~ 24 | 25~ 29 | 30~ 34 | 35~ 39 | 40~ 44 | 45~ 49 | 50~ 54 | 55~ 59 | 60歳 ~ |
|-------------------|---|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 性器クラミジア 感染症 | 男 | 17 | | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | 1 |
| | 女 | 37 | | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| | 計 | 54 | | 7 | 15 | 15 | 7 | 5 | 4 | | | | 1 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 男 | 7 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | 2 |
| | 女 | 10 | | | 2 | 4 | 1 | | | | | 1 | 2 |
| | 計 | 17 | | | 2 | 6 | 2 | 2 | | | | 1 | 4 |
| 尖圭コンジロー マ | 男 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 女 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 計 | 4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| 淋菌感染症 | 男 | 13 | | 3 | 4 | | 3 | 2 | 1 | | | | |
| | 女 | 6 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 19 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | |
| 計 | 男 | 39 | | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | | | | 3 |
| | 女 | 55 | | 8 | 12 | 18 | 6 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 |
| | 計 | 94 | | 12 | 21 | 24 | 14 | 11 | 5 | | 1 | 1 | 5 |