

「県内ノリ生産者の皆様へ」

# ノリ栄養塩情報第18号

令和4年(2022年)2月8日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
平年	10.3	10.1	9.9	10.2	10.4
R3年度	10.6	10.6	10.1	9.5	9.2

分析: 熊本県水産研究センター  
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会  
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考: 窒素量		備考 ユーカン ピア属 cells/ml		
			窒素量 μg*at/L	リン量 μg*at/L	水温 °C	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水			平年値 (2月上旬)	第17号 (2/1)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	3.6	0.9	8.3	24.5	2/7		12:00	3.7	5.1	0
		ベタ	3.4	3.0	9.8	24.8			11:45	2.4	4.8	0
	熊本北部	支柱	3.8	1.1	8.8	24.7			11:56	3.7	5.7	0
		ベタ	11.9	0.7	9.4	23.7			12:06	4.5	12.6	0
	岱明	支柱	5.7	0.6	8.7	24.7			14:50	5.3	欠測	0
		ベタ	3.3	0.5	10.0	25.0			14:43	3.9	欠測	0
	大浜	支柱	15.1	0.6	9.4	24.6			11:40	8.7	2.0	0
		ベタ	3.7	0.4	10.6	25.2			11:50	2.9	4.0	0
	河内	支柱	11.3	0.6	8.2	23.3			12:40	11.5	17.6	56
		ベタ	10.5	0.6	8.6	24.0			12:30	6.1	4.7	0
	沖新	支柱	15.4	0.5	9.7	23.3			12:30	-	15.1	20
		ベタ	18.9	0.7	9.2	22.6			12:35	-	9.5	0
	島口	支柱	12.8	0.6	9.1	23.5			11:50	5.7	14.3	0
		ベタ	9.3	0.5	9.0	24.1			11:30	4.8	18.4	0
	網田	支柱	11.7	0.6	欠測	24.0			11:00	13.4	6.5	0
ベタ		11.3	0.6	欠測	23.8	11:15	5.0	4.0	0			
平均	支柱	9.9	0.7	8.9	24.1			7.4	9.5			
	ベタ	9.0	0.9	9.5	24.1			4.2	8.3			
	全体	9.5	0.8	9.2	24.1			5.8	8.9			
八代海	三角	支柱	0.8	0.1	8.0	25.5	450	2/7	12:30	2.5	0.5	40
	平均	全体	0.8	0.1	8.0	25.5				2.5	0.5	
熊本県	平均	支柱	8.9	0.6	8.8	24.2				6.8	8.4	
		ベタ	9.0	0.9	9.5	24.1				4.2	8.3	
		全体	9.0	0.7	9.1	24.2				5.6	8.3	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上  
 ※珪藻類: キートセラス属、スケルトネマ属等

※平年は平成3年度から平成25年度の旬別平均  
 ※沖新は令和3年度からのため、平年値なし、前回値あり

