

「県内ノリ生産者の皆様へ」

# ノリ栄養塩情報第23号(最終回)

令和4年(2022年)3月15日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

| 長洲ブイ水温 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 平年     | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.7 |
| R3年度   | 11.4 | 11.9 | 12.9 | 13.5 | 14.4 |

分析:熊本県水産研究センター  
 協力:熊本県漁業協同組合連合会  
 熊本県海苔養殖連絡協議会

| 海区  | 地区   | 区分  | 今回             |                |         |             |                 | 参考:窒素量 |       | 備考<br>ユーカンビア<br>属<br>cells/ml |              |               |
|-----|------|-----|----------------|----------------|---------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------|--------------|---------------|
|     |      |     | 窒素量<br>μg*at/L | リン量<br>μg*at/L | 水温<br>℃ | 比重<br>(ρ15) | 珪藻類<br>cells/ml | 採水     |       |                               | 平年値<br>3月上旬※ | 第22号<br>(3/8) |
|     |      |     |                |                |         |             |                 | 月日     | 時刻    |                               |              |               |
| 有明海 | 荒尾   | 支柱  | 欠測             | 欠測             | 欠測      | 欠測          | 欠測              | 3/14   | 欠測    | 2.9                           | 0.6          |               |
|     |      | ベタ  | 欠測             | 欠測             | 欠測      | 欠測          | 欠測              |        | 欠測    | 5.3                           | 0.7          |               |
|     | 熊本北部 | 支柱  | 2.4            | 0.0            | 14.4    | 22.6        | 3,700           |        | 6:29  | 1.6                           | 0.5          |               |
|     |      | ベタ  | 6.5            | 0.1            | 14.6    | 21.7        | 2,000           |        | 6:40  | 2.9                           | 0.9          |               |
|     | 岱明   | 支柱  | 欠測             | 欠測             | 欠測      | 欠測          | 欠測              |        | 欠測    | 2.5                           | 0.7          |               |
|     |      | ベタ  | 欠測             | 欠測             | 欠測      | 欠測          | 欠測              |        | 欠測    | 3.4                           | 0.5          |               |
|     | 大浜   | 支柱  | 14.1           | 0.3            | 15.7    | 20.1        | 540             |        | 8:30  | 5.9                           | 1.9          |               |
|     |      | ベタ  | 9.7            | 0.1            | 15.6    | 20.8        | 1,900           |        | 8:40  | 2.2                           | 0.8          |               |
|     | 河内   | 支柱  | 8.3            | 0.0            | 14.8    | 20.2        | 9,200           |        | 不明    | 8.1                           | 欠測           |               |
|     |      | ベタ  | 3.4            | 0.0            | 14.7    | 22.1        | 12,000          |        | 不明    | 3.4                           | 欠測           |               |
|     | 沖新   | 支柱  | 3.2            | 0.0            | 14.5    | 23.9        | 8,500           |        | 7:20  |                               | 4.7          | 16            |
|     |      | ベタ  | 1.6            | 0.4            | 14.9    | 23.5        | 11,000          |        | 7:25  |                               | 1.4          |               |
|     | 畠口   | 支柱  | 4.3            | 0.0            | 15.5    | 22.7        | 9,500           |        | 7:15  | 8.6                           | 4.8          |               |
|     |      | ベタ  | 0.7            | 0.0            | 13.9    | 23.7        | 4,000           |        | 7:30  | 3.9                           | 2.5          |               |
|     | 網田   | 支柱  | 1.6            | 0.2            | 欠測      | 23.3        | 73              |        | 16:15 | 10.7                          | 1.2          |               |
| ベタ  |      | 3.6 | 0.2            | 欠測             | 23.1    | 720         | 16:00           | 2.4    | 1.4   |                               |              |               |
| 平均  | 支柱   | 5.7 | 0.1            | 15.0           | 22.1    |             |                 | 5.8    | 2.1   |                               |              |               |
|     | ベタ   | 4.3 | 0.1            | 14.7           | 22.5    |             |                 | 3.4    | 1.2   |                               |              |               |
|     | 全体   | 5.0 | 0.1            | 14.9           | 22.3    |             |                 | 4.6    | 1.6   |                               |              |               |
| 八代海 | 三角   | 支柱  | 1.3            | 0.1            | 15.0    | 23.2        | 440             | 3/14   | 7:30  | 3.5                           | 0.5          |               |
|     | 平均   | 全体  | 1.3            | 0.1            | 15.0    | 23.2        |                 |        |       | 3.5                           | 0.5          |               |
| 熊本県 | 平均   | 支柱  | 5.0            | 0.1            | 15.0    | 22.3        |                 |        |       | 5.5                           | 1.9          |               |
|     |      | ベタ  | 4.3            | 0.1            | 14.7    | 22.5        |                 |        |       | 3.4                           | 1.2          |               |
|     |      | 全体  | 4.7            | 0.1            | 14.9    | 22.4        |                 |        |       | 4.5                           | 1.5          |               |

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケルトネマ属、キートセロス属等

※平年は平成3年度から平成25年度の旬別平均

3月中旬の平年値は無いため、上旬の値を掲載

※沖新は令和3年度からのため、平年値なし、前回値あり

