

4月予報（全15枚）

病防第137号

令和4年（2022年）3月31日

各関係機関長 様

熊本県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について（送付）

令和4年度（2022年度）発生予報第1号を下記のとおり発表しましたので送付します。

令和4年度（2022年度）病虫害発生予報第1号（4月予報）

I 気象予報：令和4年（2022年）3月24日福岡管区気象台発表

◎向こう1ヶ月の気象予報（単位：％）

予報対象地域	要素	低い (少ない)	平年並	高い (多い)
九州北部全域 (含、山口県)	気温	20	30	50
	降水量	30	30	40
	日照時間	30	40	30

II 【今後、注意すべき病虫害】

1 発生の概要

作物	病虫害名	発生予想		予想の根拠			備考
		平年比	前年比	巡回調査	防除員報告	気象要因	
麦	赤かび病	並	並	—	並(±)	気温高(+) 降水高(+)	
チャ	カンザワハダニ	多	やや多	多(+)	並(±)	気温高(+) 降水多(-)	茶業研究所 平年比やや多(+)
カンキツ	ミカンハダニ	並	少	並(±)	やや多～並(±)	気温高(+) 降水多(-)	
ナシ	黒星病	並	並	—	—	降水多(+)	巡回調査(R3) 平年並(±)



本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>

作物	病害虫名	発生予想		予 想 の 根 拠			備 考
		平年比	前年比	巡回調査	防除員報告	気象要因	
冬春 トマト	灰色かび病	やや少	やや多	やや少(一)	並～やや少(±)	降水多(+)	
	葉かび病	やや少	並	やや少(一)	並(±)	降水多(+)	
	すすかび病	やや少	並	やや少(一)	並(±)	降水多(+)	
	黄化葉巻病	多	多	黄化葉巻病 多(+) コナジラミ 並(±)	多～並(+)	(コナジラミ) 気温高(+)	
冬春 ナス	うどんこ病	やや少	並	やや少(一)	並(±)	降水多(+)	
	すすかび病	並	やや多	並(±)	並～やや少(±)	降水多(+)	
冬春キ ュウリ	べと病	並	並	並(±)	やや多(+)	降水多(+)	
ウリ科 野菜	キュウリ・メロン 退緑黄化病 スイカ 退緑えそ病	並	並	退緑黄化病 並(±) コナジラミ 並(±)	キュウリ 多 メロン 並 スイカ やや多～並(+)	(コナジラミ) 気温高(+)	
イチゴ	うどんこ病	やや少	やや少	並(±)	やや多～並(±)	降水多(+)	
	ハダニ類	やや多	多	やや多(+)	やや多～並(±)	気温高(+)	



本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>

作物	病害虫名	発生予想		予 想 の 根 拠			備 考
		平年比	前年比	巡回調査	防除員報告	気象要因	
イチゴ	アザミウマ類	多	やや多	多(+)	多～並(+)	気温高(+)	
冬春 果菜類	灰色かび病 (トマト除く)	並	並	ナス やや多 キュウリ 並 イチゴ 並 (±)	ナス 並～やや少 キュウリ 並 イチゴ 並～やや少 (±)	降水多(+)	
	タバココナジ ラミ	並	並	トマト 並 ナス 並 キュウリ 並 (±)	トマト並 ナス やや多 ～やや少 キュウリ 並 メロン やや多～並 スイカ やや 多～やや少 (±)	気温高(+)	
	アザミウマ類 (イチゴ除く)	並	並	ナス 並 キュウリ やや多 (±)	ナス やや多 ～やや少 キュウリ 並 スイカ 並～ やや少 (±)	気温高(+)	
野菜 全般	アブラムシ類	並	並	トマト 並 ナス 並 キュウリ 並 イチゴ 並 (±)	トマト 並 ナス やや多～並 キュウリ 並 メロン 並 スイカ 並 イチゴ やや多～並 (±)	気温高(+)	

※予想の根拠末尾の括弧書きは、(+)は発生を助長する要因、(-)は発生を抑制する要因、(±)は影響が少ない要因であることを示す。



本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>

2 予想発生量、根拠、対策等

◎麦類

1) 赤かび病

(1) 発生量：並

(2) 根拠 ア アメダス実測値（熊本市）を用いた赤かび病の発生予測では、3月中旬に多発条件が発生しているもののその後は発生していない（±）。

(3) 対策 ア 赤かび病の主な感染時期は、大麦は蒴殻抽出期（穂揃い10日後）、小麦は開花期（出穂7～10日後）である。

イ 防除適期は、大麦は穂揃い期10日後頃（出穂期12～14日後）とその7～10日後。小麦は開花始～開花最盛期（出穂期7～10日後）とその7～10日後。

ウ 防除薬剤の効果は予防が主体であるため、適期に2回の防除を行う。

エ 麦類の出穂期や開花期等は気温に左右されるため、今後の生育状況に注意する。

（参考）麦作況生育調査における出穂期

（合志市：農産園芸研究所作物研究室 3/20 現在）

麦 種	品 種	本 年	前 年	平 年	備考
大 麦	はるしずく	—	3 月 18 日	3 月 31 日	本年は平年並の見込み
小 麦	シロガネコムギ	—	3 月 21 日	4 月 4 日	本年は平年並の見込み

※赤かび病多発条件出現日の判定結果は病虫害防除所ホームページ（<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>）に掲載し、随時更新します。

◎茶

1) カンザワハダニ

(1) 発生量：多

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、寄生葉率11.5%（平年2.4%）で平年比多の発生であった（+）。

イ 茶業研究所（御船町）の調査では、3月第4半旬の寄生葉率は13.0%（平年6.1%）と平年比やや多の発生であった（+）。

(3) 対策 ア 茶園をよく観察し、発生が目立つ場合は防除を行う。特に被覆栽培を行う場合は、ダニが増殖しやすくなるため

、被覆前に発生状況をよく観察し、防除を行う。

イ 一番茶摘採期を考慮し、使用前日数等を確認した上で薬剤を選定する。

ウ 薬剤散布の際には、すそ部及び樹冠内部の葉裏にもムラなく薬剤が行き渡るように十分な量（400L/10a）を散布する。また、薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う

エ 晩霜害を受けると、摘採時期の遅延等により本虫の被害が助長されるため、早めに対策を行う。

オ 防除の詳細については、令和4年3月23日付け発生予察注意報第5号も参考にする（<http://www.jpnp.ne.jp/kumamoto/R3/yosatu/220323tyui.pdf>）

。




図1 カンザワハダニ寄生率の推移



本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>

◎カンキツ


1) ミカンハダニ

(1) 発生量：並

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、寄生葉率 2.5% (平年 3.7%)、寄生頭数は 0.4 頭/10 葉 (平年 1.4 頭/10 葉) と平年並の発生であった (±)。

(3) 対策 ア 越冬期にマシン油乳剤を散布しなかったほ場では、ミカンハダニの発生に注意し、4月以降の薬剤防除を徹底する。

イ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



ミカンハダニの寄生葉率の推移

◎ナシ

1) 黒星病


(1) 発生量：並

(2) 根拠 ア 黒星病は、前年の発生が多い場合、翌春の発生も多い傾向がある。前年は概ね平年並の発生であった (±)。

イ 気象予報によると、向こう1か月の降水量は平年比多の予想である (+)。

(3) 対策 ア 落弁期以降の予防防除を徹底する。

イ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。また、Q o I 系、DMI 系及びSDHI 系の薬剤は年間使用回数をそれぞれの系統で2回までとする。



黒星病発病葉率の推移

◎冬春トマト

1) 灰色かび病


(1) 発生量：やや少

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、茎葉で発病株率 7.4% (平年 10.7%)、果実で発病株率 0.3% (平年 1.5%) で平年比やや少の発生であった (-)。

(3) 対策 ア 発病果、発病葉、花卉は伝染源となるので、早期に除去し処分する。

イ 過度のかん水を避けるとともに、温度管理に注意しながら換気に努める。

ウ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



灰色かび病の発病株率(茎葉)の推移
(冬春トマト)



2) 葉かび病

(1) 発生量：やや少


(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、発病株は確認されず（発病株率平年4.7%）、平年比やや少の発生であった（－）。

(3) 対策 ア 抵抗性品種であっても発病に注意し、発病葉は伝染源となるので、早期に除去し、処分する。

イ 発病を確認した場合は、直ちに薬剤による防除を行う。散布の際は、散布むらが生じないように、十分量の薬液を丁寧にかける。

ウ 過度のかん水を避けるとともに、温度管理に注意しながら換気に努める。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



3) すすかび病

(1) 発生量：やや少


(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、発病株は確認されず（発病株率平年1.5%）、平年比やや少の発生であった（－）。

(3) 対策 ア 発病葉は伝染源となるので、早期に除去し、処分する。

イ 発病を確認した場合は、直ちに薬剤による防除を行う。散布の際は、散布むらが生じないように、十分量の薬液を丁寧にかける。

ウ 過度のかん水を避けるとともに、温度管理に注意しながら換気に努める。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



4) 黄化葉巻病

(1) 発生量：多

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、発病株率4.9%（平年0.5%）で、平年比多の発生であった（＋）。


イ 3月の巡回調査では、コナジラミ類の寄生葉率は0.6%（平年0.4%）で、平年並であった（±）。

(3) 対策 ア タバココナジラミを施設内で「増やさない」対策及び保毒虫を施設外に「出さない」対策を徹底する（3 防除のポイント等の「野菜のウイルス病まん延を防止しましょう」を参照）。

イ 施設内外の雑草はタバココナジラミの重要な増殖源となるので除去する。

ウ 黄色粘着板トラップを施設内に設置し、タバココナジラミの早期発見に努める。

エ 防除の詳細については、令和3年10月27日付け発生予察注意報第3号も参考にする（<http://www.jppn.ne.jp/kumamoto/R3/yosatu/211027tyui.pdf>）。




本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>

◎冬春ナス


1) うどんこ病

- (1) 発生量：やや少
- (2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、発病葉は確認されず（発病葉率平年2.3％）で、平年比やや少の発生であった（－）。
- (3) 対策 ア 発病葉は伝染源となるので、早期に除去し、処分する。
 イ 多発後は、防除が困難なので初期防除を徹底する。
 ウ 多肥や過繁茂を避け、適正な管理を行う。
 エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



2) すずかび病


- (1) 発生量：並
- (2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、発病株率39.6％（平年41.8％）で平年並の発生であった（±）。
- (3) 対策 ア 発病葉は伝染源となるので、早期に除去し、処分する。
 イ 発病を確認した場合は、直ちに薬剤による防除を行う。散布の際は、散布むらが生じないように、十分量の薬液を丁寧にかける。
 ウ 発病葉や施設資材上に付着した病原菌が次作の伝染源となるため、発生が多い場合は、栽培終了後に太陽熱消毒を行い、病原菌密度を低下させる。
 エ 過度のかん水を避けるとともに、温度管理に注意しながら換気に努める。
 オ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



◎キュウリ

1) ベと病

- (1) 発生量：並
- (2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、一部地域で植替えもあり、発病株率7.7％（平年7.3％）で平年並の発生であった（±）。
- (3) 対策 ア 湿度が高い条件や肥料切れで多発するので、過湿を避け、肥培管理に注意する。
 イ 多発生後は防除が困難なので初期防除を徹底し、薬剤が葉裏に十分かかるように散布する。
 ウ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



◎ウリ科野菜


1) キュウリ退緑黄化病、メロン退緑黄化病、スイカ退緑えそ病

(1) 発生量：並

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、キュウリにおいて、発病株率7.7%（平年7.3%）で平年並の発生であった（±）。

イ 同月の巡回調査において、キュウリのタバココナジラミの寄生葉は確認されず（寄生葉率平年0.8%）、平年並の発生であった（±）。

(3) 対策 ア 保毒虫を施設内で「増やさない」対策および「出さない」対策を徹底する（3 防除のポイント等の「**野菜のウイルス病まん延を防止しましょう**」を参照）。



◎イチゴ

1) うどんこ病

(1) 発生量：やや少


(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、発病株は確認されず（発病株率平年0.1%）、平年並の発生であった（±）。

(3) 対策 ア 多発生後は防除が困難なので、初期防除を徹底する。

イ 発病果、発病葉は伝染源となるので、早期に除去し、処分する。

ウ 薬剤防除は葉裏に十分かかるように散布する。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



2) ハダニ類

(1) 発生量：やや多


(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、寄生葉率28.0%（平年17.9%）で、平年比やや多の発生であった（+）。

(3) 対策 ア 気温が上昇すると急激に増加するため、発生初期の防除を徹底する（3 防除のポイント等の「イチゴにおけるハダニ類の防除対策」を参照）。

イ 寄生葉を早めに取り除き、ほ場外に処分する。

ウ 薬剤防除の際、事前に下葉かぎを行い、葉裏にも十分かかるように丁寧に散布する。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



ハダニ類の寄生葉率の推移(イチゴ)
(1-4月:本ぽ)

オ 天敵（カブリダニ類）を放飼したほ場でハダニ類が発生している場合は、天敵に影響の少ない薬剤の散布や天敵の追加放飼を行う。なお、それでも発生が多いほ場では、効果の高い殺ダニ剤を使用した上で、薬剤を主体とした防除体系に切り替える。

3) アザミウマ類

(1) 発生量：多

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、寄生株率48.0%（平年12.4%）で、平年比多の発生であった（+）。


(3) 対策 ア 今後、気温の上昇に伴い、施設内での発生が増加するとともに、施設外からの飛び込みも多くなるため、花を注意深く観察することで早期に発見し、発生初期からの防除を徹底する。

イ 施設内外の雑草は、重要な発生源となるため、開花する前に除草する。

ウ 薬剤防除にあたっては、天敵や訪花昆虫（ミツバチ等）への影響を考慮し、薬剤を選定する。ただし、成虫の発生が多い場合は、アザミウマ類の防除を優先し、アザミウマ類成虫に効果の高い薬剤を選択する。その場合、天敵にも大きく影響するため、散布後のハダニ類の増加に注意する。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。

オ 防除の詳細については、令和4年2月1日付け発生予察注意報第4号も参考にする（<http://www.jppn.ne.jp/kumamoto/R3/yosatu/220201tyui.pdf>）。



アザミウマ類の寄生株率の推移(イチゴ)
(1-4月:本ぽ)



◎冬春果菜類

1) 灰色かび病（トマト除く）


(1) 発生量：並

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、ナスで発病株率1.2%（平年0.6%）で平年比やや多、キュウリで発病株0.7%（平年0.5%）で平年並、イチゴで発病株は確認されず（発病株率平年0.1%）平年並の発生であった（±）。

(3) 対策 ア 発病果、発病葉、花弁は伝染源となるので、早期に除去し、処分する。

イ 過度のかん水を避けるとともに、温度管理に注意しながら換気に努める。

ウ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



灰色かび病の発病株率の推移
(冬春ナス)

2) タバココナジラミ

(1) 発生量：並


(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、トマトで寄生葉率0.6%（平年0.4%）で平年並、ナスで寄生葉率4.4%（平年5.8%）で平年並、キュウリで寄生葉は確認されず（寄生葉率平年0.8%）平年並の発生であった（±）。

(3) 対策 ア タバココナジラミは、トマト黄化葉巻病、トマト黄化病、ウリ類退緑黄化病、スイカ退緑えそ病の病原ウイルスを媒介するので、トマト、ウリ類では本虫の発生に注意し、防除対策を徹底する（3 防除のポイント等の「**野菜のウイルス病まん延を防止しましょう**」を参照）。


イ 施設内部の雑草は、重要な増殖源となるので除去する。

ウ 黄色粘着トラップを施設内に設置し、早期発見に努める。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



コナジラミ類の寄生葉率の推移
(冬春トマト)



コナジラミ類の寄生葉率の推移
(冬春ナス)



3) アザミウマ類（イチゴ除く）

(1) 発生量：並


(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、ナスで寄生葉は確認されず（寄生葉率平年0.4%）で平年並、キュウリで寄生葉率5.0%（平年0.4%）で平年比多の発生であった（±）。

(3) 対策 ア これからの時期は、施設内での発生が増加するので、粘着トラップ等を設置し、早期発見に努め、早期防除を徹底する。粘着トラップの色は、ミナミキイロアザミウマに対しては青色、ミカンキイロアザミウマに対しては青色または黄色を使用する。


イ ミナミキイロアザミウマはウリ類黄化えそ病の病原ウイルスを媒介するので、ウリ類では本虫の発生に注意し、防除対策を徹底する（3 防除のポイント等の「**野菜のウイルス病まん延を防止しましょう**」を参照）。

ウ 施設内の雑草は、重要な増殖源となるので除去する。

エ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



アザミウマ類の寄生葉率の推移
(冬春ナス)



アザミウマ類の寄生葉率の推移
(冬春キュウリ)

◎野菜全般


1) アブラムシ類

(1) 発生量：並

(2) 根拠 ア 3月の巡回調査では、トマトで寄生葉は確認されず（寄生葉率平年0.0%）平年並、ナスで寄生葉は確認されず（寄生葉率平年0.5%）平年並、キュウリで寄生葉は確認されず（寄生葉率平年0.1%）平年並、イチゴで寄生葉率1.7%（平年1.1%）で平年並の発生であった（±）。

(3) 対策 ア 気温の上昇に伴い、有翅虫の飛来が多くなるため、発生に注意し、早い時期からの防除を徹底する。

イ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。



アブラムシ類の寄生葉率の推移(イチゴ)
(1-4月:本ぽ)



3 防除のポイント等

イネいもち病の防除対策について

いもち病は保菌種粳を第一次伝染源として苗で本田へと持ち込まれます。そのため、保菌種粳から苗への感染を防ぐことが重要です。

- (1) いもち病は種子伝染する。購入種子を使用する場合も塩水選と種子消毒を徹底する。
- (2) 登録農薬での浸漬処理では、薬液が行き渡るように網袋等に粳を入れ過ぎないようにする。また、薬液の温度は10℃以上とする。
- (3) 温湯消毒では、温度管理を適正に行う。
- (4) 種子消毒後の苗にいもち病菌を感染させないため、育苗床に被害わらや粳がらを持ち込まない。
- (5) 余り苗及び補植用苗は、伝染源となりやすいので、本ばに長期間置かない。

スクミリンゴガイの防除対策について

スクミリンゴガイは水温が15℃を超えると活動を開始しますので、移植後はほ場をよく観察して、以下の防除対策を徹底しましょう。

- (1) 水路から水田への侵入を防ぐため、取水口および排水口は金網（4mm以下）で覆う。さらに、排水口は、常に排水路の水面より高くなる場所に配置する。
- (2) 深水管理すると被害が大きくなるので、発生が多い水田では水深1cm以下の浅水管理を行う。
- (3) 移植後に水田内の貝が多いときは捕獲する。特に、浸冠水後は貝が侵入しているので、見回り捕獲する。
- (4) 薬剤防除を行う際、薬剤には貝が摂食して殺貝効果が現れる剤（メタアルデヒド等）と食害防止する剤（カルタップ等）があり、食害防止効果を持つ剤の使用後に、食毒による効果のある剤を使用すると効果が発揮できないので併用はしない。



イチゴ親株におけるうどんこ病、ハダニ類の防除対策 ～次作での発生リスク低減に向けて～

本作は、本ぽにおけるうどんこ病の発生は少なく推移していましたが、ハダニ類は平年比やや多の発生状況となっています。次作で多発させないためには、病原菌やハダニ類を親株に持ち込まないことが重要となるため、以下の対策を徹底しましょう。

1 うどんこ病の防除対策

- (1) 本ぽからの持ち込みを防ぐため、親株ほの管理作業は最初に行う。
- (2) 親株での発生に注意し、発病後は直ちに薬剤防除を行う。
- (3) 発病葉は伝染源となるため、早期に除去し、処分する。
- (4) 薬剤防除は葉裏に十分かかるように散布する。
- (5) うどんこ病菌はイチゴでのみ寄生がくり返されるため、定期的に苗の更新を行い、菌の伝染環を断ち切る。

2 ハダニ類の防除対策

- (1) 本ぽからの持ち込みを防ぐため、親株ほの管理作業は最初に行う。
- (2) 本ぽで除去した老化葉や収穫終了後の株をほ場周辺に放置しない。
- (3) ほ場周辺の雑草は発生源となるので、除草を徹底する。
- (4) 薬剤防除の際は、効果を高めるために事前に下葉かぎを行い、十分な液量で薬液が葉裏に十分かかるように丁寧に散布し、散布むらをなくす。
- (5) 育苗期は気門封鎖剤などの物理的資材を積極的に活用する。気門封鎖剤は、ハダニ類に直接付着しないと効果がないため、特に丁寧に散布する。また、卵への効果や残効性が低いため、7日程度の間隔で複数回散布する。



野菜のウイルス病まん延を防止しましょう

本県では「トマト黄化葉巻病」、「トマト黄化病」、「キュウリ・メロン黄化えそ病」、「キュウリ・メロン退緑黄化病」、「スイカ退緑えそ病」などのウイルス病が発生しています。これらの病気の原因となる各ウイルスは、コナジラミやアザミウマ等の微小害虫により媒介されます。

これらの微小害虫は、気温が高くなると活動が活発になるため、今後、ウイルスを持った虫（保毒虫）が施設外に拡散することによってウイルス病の発生が増加することが懸念されます。

そこで、確実にウイルスの伝染環（つながり）を絶ち、地域におけるウイルス病の拡大を防ぐため、以下の2つの対策を必ず行いましょう。

1 保毒虫を「増やさない」対策

施設内で微小害虫を増やさないようにし、栽培終了後に保毒虫が野外へ飛び出す危険性を減らしましょう。

- (1) 発病株は重要な伝染源となるので、適正に処分する。
- (2) ハウス内に粘着トラップを設置し、害虫の密度を低下させる。
- (3) コナジラミ類の発生がみられるほ場では、継続した防除を行う。
- (4) トマト黄化葉巻病抵抗性品種であっても、トマト黄化葉巻ウイルス（TYLCV）に感染し伝染源となるため、コナジラミ類の防除を継続して行う。
- (5) ウリ類の連続栽培を行う場合は、保毒虫を次作に持ち越さないように防除を行う。

2 保毒虫を施設外に「出さない」対策

地域（野外）の保毒虫密度を高めないために、ハウス内から微小害虫を逃がさないようにしましょう。

- (1) 栽培中の「出さない」対策
 - ア 定期的に施設周辺を見回り、ハウスビニルや防虫ネットに破れが無いか点検し、必要に応じて修繕を行う。
 - イ 成虫に効果の高い剤を主体とした薬剤防除を行う。
- (2) 栽培終了後の「出さない」対策
 - ア 微小害虫の施設外への飛び出しを防ぐため、栽培終了後は必ずハウスを密閉してから一斉に植物を枯らす。
 - イ 悪天候等で作物の枯死に時間がかかると予想される場合には、古株枯死に使用できる薬剤^{注1}の併用も検討する。なお、使用にあたっては、必ずラベルなどで使用方法を確認し、遵守する。
 - ウ 地域で取り決めた密閉処理期間を遵守し、微小害虫及びウイルスを完全に死滅させる。
 - エ 施設内の片付けは、密閉処理が終了してから行う。

注1) 令和4年3月31日現在において使用可能な薬剤は以下のとおり

- ・カーバムナトリウム塩液剤（商品名：キルパー）
- ・クロルピクリンくん蒸剤（商品名：クロピクフロー）

※クロルピクリンくん蒸剤のうち使用できるのはフロー剤のみ



本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>

Ⅲ 【その他の病害虫】

作物	病害虫名	発生予想 (平年比)	発生概況及び注意すべき事項等
カンキツ	そうか病	並	巡回調査では一部ほ場で発生がみられ平年比やや多(+)。防除員報告では平年並～少(－)。防除効果が高い幼芽期(新芽が5mm以内)に防除する。
	かいよう病	並	巡回調査では一部ほ場で発生がみられ平年比やや多(+)。防除員報告では平年並～やや少(±)。果実への感染を防止するため、春葉の防除を行う。
ナシ	赤星病	並	前年の巡回調査では、6月に一部ほ場で多発生がみられたが、調査期間を通して概ね平年並(±)。黒星病との同時防除を行う。
キュウリ	うどんこ病	並	巡回調査は、平年並(±)。防除員報告は、やや多(+)。多発後は防除が困難なので、発生初期の防除を徹底する。
メロン	べと病	並	防除員報告は、平年並(±)。肥料切れで多発するので、適正な肥培管理を行う。
	つる枯病	並	防除員報告は、平年並(±)。灌水は直接株元に行わず、株元周辺を出来るだけ乾燥状態に保つ。
スイカ	つる枯病	並	防除員報告は、平年並(±)。灌水は直接株元に行わず、株元周辺を出来るだけ乾燥状態に保つ。
【野菜病害虫の共通対策事項】 ・換気や排水を良くし、過湿の防止に努める(病害)。 ・多発後は防除が困難になるので、早期発見と初期防除に努める。 ・薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の異なる薬剤のローテーション使用を行う。			

Ⅳ その他

農薬安全使用上の留意点

農薬を使用する際は、必ずラベルなどで使用方法を確認し、登録がある農薬を使うとともに、収穫前使用日数や使用回数、希釈倍数等を遵守しましょう。

また、ミツバチや魚介類など周辺動植物及び環境へ影響がないよう、飛散防止を徹底するとともに、事前に周辺の住民や養蜂業者等へ薬剤散布の連絡を行うなど、危害防止に努めましょう。

◎ 詳しい内容等については 病害虫防除所(農業研究センター生産環境研究所予察指導室)(TEL:096-248-6490)にお問い合わせ下さい。

※なお、本文及び各種トラップのデータ等はホームページ「<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>」上に掲載しています。



本予報と関連データは、ホームページに掲載しています。

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>