

<2024>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果 (9/18 現在)

地点名	本年		平年		平年比	
	第7世代	第8世代	第7世代	第8世代	第7世代	第8世代
鹿北	9月12日	10月6日	9月28日	-	16日早い	-
菊池	9月3日	9月22日	9月15日	10月11日	12日早い	19日早い
甲佐	9月7日	9月27日	9月13日	10月6日	6日早い	9日早い
水俣	8月28日	9月15日	9月12日	10月5日	15日早い	20日早い
上	9月8日	9月29日	9月19日	10月16日	11日早い	17日早い

※平年は気象の平年値を使用した予測日

2 設定条件

計算期間	2024年 1月 1日 ~2024年 10月 31日					
アメダス地点	鹿北・菊池・甲佐・水俣・上					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値 (9/18 ~)					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度