

令和6年度 いもち病感染好適条件(BLASTAM)判定結果(8～9月)

発生指標	●	:好適条件	1	:準好適条件1	2	:準好適条件2	3	:準好適条件3	4	:準好適条件4
	—	:好適条件なし	?	:判定不能						

・好適条件(いもち病の感染に好適な気象条件)

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間(22～25度)～17時間(15度)、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件(好適条件に準ずる気象条件)

準好適条件1:湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。

準好適条件2:湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。

準好適条件3:湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。

準好適条件4:湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを越える雨(胞子が雨で流される。)があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合がある。

また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出て小さな病斑しかでない。

日付	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇 乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
8/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/6	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	—
8/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/9	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/10	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/14	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
8/15	2	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—
8/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/17	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/18	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
8/19	2	—	—	3	3	—	3	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—
8/20	2	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—
8/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/22	—	—	—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—
8/23	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/24	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
8/25	—	—	?	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—
8/26	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/27	—	—	?	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
8/28	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8/30	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—
8/31	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
9/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—
9/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
9/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	3	3	—
9/16	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
9/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
9/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/26	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●の合計日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昨年の●日数	3	3	0	0	5	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0
過去5カ年平均の●日数	2.0	4.2	1.2	1.6	2.6	0.8	2.8	3.8	1.0	1.6	1.2	1.2	0.4	0.8	1.6	2.6	0.0

令和6年度 いもち病感染好適条件(BLASTAM)判定結果

発生指標	●	:好適条件	1	:準好適条件1	2	:準好適条件2	3	:準好適条件3	4	:準好適条件4
	—	:好適条件なし	?	:判定不能						

・好適条件(いもち病の感染に好適な気象条件)

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間(22～25度)～17時間(15度)、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件(好適条件に準ずる気象条件)

準好適条件1:湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。(前日までの気温が低い)

準好適条件2:湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。(前日までの気温が高い)

準好適条件3:湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。(当日の気温が不適)

準好適条件4:湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。(当日の湿潤時間が短い)

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを越える雨(胞子が雨で流される。)があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合がある
また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出て小さな病斑しかでない。

	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
4/1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	3	1
4/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/5	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	—	—	4	—	4	—
4/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/7	3	3	4	4	3	1	3	3	4	4	4	4	1	—	1	1	—
4/8	—	—	1	—	—	—	4	—	—	4	?	4	4	4	—	—	4
4/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—
4/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/12	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
4/14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/15	—	—	—	—	—	4	—	—	4	4	4	—	—	—	—	—	—
4/16	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	—	—	1	—
4/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/21	4	3	1	1	3	1	1	4	1	1	—	1	1	4	4	4	—
4/22	—	4	4	4	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—
4/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—
4/24	—	4	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—
4/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/27	—	—	—	—	4	—	4	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
4/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/30	—	—	—	4	—	—	4	—	4	1	—	4	—	—	—	4	1
5/1	—	4	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
5/2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/7	—	1	1	4	—	—	—	4	—	1	1	1	●	●	4	—	—
5/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—
5/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/12	—	—	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/31	4	4	●	—	4	●	4	4	—	●	4	—	●	—	—	—	●

令和6年度 いもち病感染好適条件(BLASTAM)判定結果

発生指標	●	: 好適条件	1	: 準好適条件1	2	: 準好適条件2	3	: 準好適条件3	4	: 準好適条件4
	—	: 好適条件なし	?	: 判定不能						

・好適条件(いもち病の感染に好適な気象条件)

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間(22～25度)～17時間(15度)、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件(好適条件に準ずる気象条件)

準好適条件1: 湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。(前日までの気温が低い)

準好適条件2: 湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。(前日までの気温が高い)

準好適条件3: 湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。(当日の気温が不適)

標準適条件4: 湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。(当日の湿潤時間が短い)

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを超える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを超える雨(胞子が雨で流される。)があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合がある。
また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出て小さな病斑しかでない。

[illegible]

令和6年度 いもち病感染好適条件(BLASTAM)判定結果

発生指標	●	: 好適条件	1	: 準好適条件1	2	: 準好適条件2	3	: 準好適条件3	4	: 準好適条件4
	—	: 好適条件なし	?	: 判定不能						

・好適条件(いもち病の感染に好適な気象条件)

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間(22～25度)～17時間(15度)、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件(好適条件に準ずる気象条件)

準好適条件1: 湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。(前日までの気温が低い)

準好適条件2: 湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。(前日までの気温が高い)

準好適条件3: 湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。(当日の気温が不適)

準好適条件4: 湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。(当日の湿潤時間が短い)

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを越える雨(胞子が雨で流される。)があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合がある。

また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の目が続くと病斑が出ても小さな病斑しかでない。

[illegible]