

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第1号

令和6年(2024年)10月22日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲バイ水温	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	分析: 熊本県水産研究センター
10年平均値	22.8	22.7	22.5	22.5	22.4	協力: 熊本県漁業協同組合連合会
R6年度	25.2	25.4	25.4	24.8	24.5	熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 11:21						参考:窒素量			備 考
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (10月下旬)	R5年 (10/11)	
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	9.3	0.8	24.9	23.4	100	10/21	11:25	8.4	5.7	
		ベタ	7.6	0.7	24.0	23.3	3		11:42	6.5	5.3	
	熊 本 北 部	支柱	9.6	0.6	24.0	23.3	20		11:37	9.0	5.3	
		ベタ	12.1	0.8	24.2	22.5	12		11:40	7.0	3.5	
	岱 明	支柱	10.5	0.9	24.7	23.1	12		14:54	8.1	6.3	
		ベタ	8.1	0.7	25.5	23.3	37		14:45	5.6	4.8	
	大 浜	支柱	10.5	0.7	24.0	22.6	170		11:20	11.5	27.9	
		ベタ	9.8	0.7	24.3	22.8	120		11:35	5.8	7.2	
	河 内	支柱	14.3	1.0	24.1	22.9	120		11:00	13.5	19.5	
		ベタ	8.7	0.7	24.4	21.9	160		11:05	8.0	9.0	
	松 尾	支柱	57.2	2.9	24.9	20.0	25		12:00	11.5	－	
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	7.7	－	
	沖 新	支柱	9.7	0.8	24.5	22.6	78		11:00	7.1	10.9	
		ベタ	9.0	0.6	23.9	22.9	62		11:00	5.2	5.3	
	畠 口	支柱	19.3	1.3	24.5	22.1	78		13:30	8.6	－	
		ベタ	5.8	0.5	24.6	23.6	270		10:30	4.8	－	
	網 田	支柱	6.0	0.5	24.9	23.4	42		10:00	8.9	9.1	
		ベタ	4.4	0.4	24.5	23.8	40		10:00	7.7	7.2	
	平均	支柱	16.3	1.1	24.5	22.6			9.6	12.1		
		ベタ	8.2	0.6	24.4	23.0			6.5	6.0		
		全体	12.5	0.9	24.5	22.8			8.0	9.1		
八代海	三 角	支柱	4.1	0.6	25.7	22.3	31	10/21	11:00	6.6	1.4	
	平均	全体	4.1	0.6	25.7	22.3			6.6	1.4		
熊本県	平均	支柱	15.1	1.0	24.6	22.6			9.3	10.8		
		ベタ	8.2	0.6	24.4	23.0			6.5	6.0		
		全体	12.0	0.8	24.5	22.8			8.0	8.6		

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
※珪藻類：スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

