

〈2025〉

有効積算温度によるナシマルカイガラムシの発生予測
(JPPネット利用)

1 計算結果

5月14日 現在

地点名	第一世代発生初期		第一世代発生ピーク時期	
	本年	平年※	本年	平年※
大牟田	5月10日 ～ 5月14日	5月17日 ～ 5月21日	5月20日 ～ 5月24日	5月26日 ～ 5月31日
岱明	5月9日 ～ 5月13日	5月15日 ～ 5月19日	5月18日 ～ 5月23日	5月24日 ～ 5月28日
菊池	5月10日 ～ 5月15日	5月18日 ～ 5月22日	5月20日 ～ 5月25日	5月27日 ～ 5月31日
熊本	5月5日 ～ 5月9日	5月11日 ～ 5月15日	5月15日 ～ 5月19日	5月20日 ～ 5月24日
三角	5月8日 ～ 5月13日	5月13日 ～ 5月17日	5月18日 ～ 5月22日	5月22日 ～ 5月26日
甲佐	5月9日 ～ 5月14日	5月15日 ～ 5月19日	5月19日 ～ 5月24日	5月24日 ～ 5月28日
本渡	5月9日 ～ 5月14日	5月16日 ～ 5月20日	5月19日 ～ 5月24日	5月26日 ～ 5月30日
八代	5月6日 ～ 5月10日	5月13日 ～ 5月17日	5月16日 ～ 5月20日	5月22日 ～ 5月26日
水俣	5月8日 ～ 5月12日	5月14日 ～ 5月18日	5月18日 ～ 5月23日	5月24日 ～ 5月28日
上	5月12日 ～ 5月16日	5月17日 ～ 5月21日	5月22日 ～ 5月27日	5月27日 ～ 5月31日
牛深	5月3日 ～ 5月8日	5月8日 ～ 5月12日	5月13日 ～ 5月18日	5月17日 ～ 5月22日

※平年値は過去30年間の平均気温で算出

2 設定条件

計算期間	2025年3月1日～2025年10月30日				
アメダス地域	大牟田、岱明、菊池、熊本、三角、甲佐、本渡、八代、水俣、上、牛深				
気象データ	毎正時データ				
未来のデータ	平年値（5/14～）				
気温補正	設定しない				
発育パラメータ	有効積算温度	予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度	発育上限温度以上を除く			
	発育停止温度	設定しない			
	設定名称	発育零点	発育上限温度	発育停止温度	有効積算温度
	第一世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	313.8℃
	第一世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	353.6℃
	第一世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	405.6℃
	第一世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	452.0℃
	第二世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	990.8℃
	第二世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	1035.4℃
	第二世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	1139.3℃
	第二世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	1170.9℃