

<2025>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果 (6/18 現在)

地点名	本年		平年 (過去10年の平均)		平年比	
	第3世代	第4世代	第3世代	第4世代	第3世代	第4世代
鹿北	7月8日	7月27日	7月5日	7月24日	3日遅い	3日遅い
菊池	7月2日	7月21日	6月28日	7月17日	4日遅い	4日遅い
甲佐	7月2日	7月21日	6月28日	7月17日	4日遅い	4日遅い
水俣	6月30日	7月19日	6月26日	7月16日	4日遅い	3日遅い
上	7月4日	7月22日	7月1日	7月21日	3日遅い	1日遅い

※平年は2015年～2024年の実測値平均

2 設定条件

計算期間	2025年 1月 1日 ～2025年 10月 31日					
アメダス地点	鹿北・菊池・甲佐・水俣・上					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値 (6/18～)					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度