

赤潮情報第23号

熊本県水産研究センター 浅海干潟研究部

TEL0964-56-2613 FAX56-4533

八代海でゴニオラックスの赤潮が発生しています

6月30日及び7月1日に、熊本県等が調査したところ、八代海でゴニオラックス ポリグラマによる赤潮が発生しています（海水1ml当たりの細胞数は下図を参照して下さい）。

本種には魚毒性はないと言われていますが、高密度に発生した場合、海水の溶存酸素の低下を引き起こすと言われています。

周辺海域で養殖・蓄養をされている場合は、海の色の変化や、飼育生物の様子に十分注意してください。

※数字は細胞数です。

●はゴニオラックスポリグラマ、●は珪藻類と濁りによる着色域です。

(7/1) 八代海湾奥～上天草市姫戸地先
珪藻類
(スケルトナマ属及びキートセロス属)
0m: 2800～3800

(6/30) 天草市下浦町地先
ゴニオラックス ポリグラマ
0m: 6000

(6/30) 天草市栖本町地先
ゴニオラックス ポリグラマ
0m: 21000

(7/1) 天草市嵐口地先
ゴニオラックス ポリグラマ
0m: 0
2m: 5
5m: 110

(7/1) 津奈木沖
ゴニオラックス ポリグラマ
0m: 0
2m: 0
5m: 0
18m: 600

(7/1) 天草市御所浦町地先
ゴニオラックス ポリグラマ
0m: 0
2m: 0
5m: 1
7m: 920

(7/1) 天草市宮野河内沖
ゴニオラックス ポリグラマ
0m: 21
2m: 21
5m: 9

図 赤潮発生海域

赤潮情報 ホームページ



赤潮ネット



調査結果については、赤潮情報 ホームページや赤潮ネットでも確認できますので、ご利用ください（ホームページの更新に時間を要する場合があります）。

赤潮情報 ホームページ <https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/1794.html>

赤潮ネット https://akashiwo.fra.go.jp/public/kaikuInit.php?qkaiku_id=1&sid=1