

<2025>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果 (8/12 現在) 茶樹用

地点名	本年		平年 (過去10年の平均)		平年差	
	第6世代	第7世代	第6世代	第7世代	第6世代	第7世代
鹿北	8月30日	9月21日	8月31日	9月22日	1日早い	1日早い
菊池	8月22日	9月9日	8月21日	9月9日	1日遅い	± 0 日
甲佐	8月23日	9月11日	8月22日	9月10日	1日遅い	1日遅い
水俣	8月19日	9月6日	8月19日	9月7日	± 0 日	1日早い
上	8月26日	9月14日	8月27日	9月16日	1日早い	2日早い

※平年は2015年～2024年の実測値平均

2 設定条件

計算期間	2025年 1月 1日 ～2025年 10月 31日					
アメダス地点	鹿北・菊池・甲佐・水俣・上					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値 (8/12～)					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度