

4 死産と乳児死亡


(1) 本県の死産率は、前年より1.4ポイント増加

令和5年の全国の死産率は20.9で、前年より1.6ポイント増加した。本県は20.2で、前年より1.4ポイント増加している。


うち、自然死産率（出産千対）は、全国9.6で前年より0.2ポイント増。本県は8.6であり、前年より1.0ポイント減少した。

また、人工死産率（出産千対）は、全国11.3で前年より1.4ポイント増。本県は11.6で、2.3ポイントの増加であった。

母の年齢階級別に死産割合をみると、自然死産では30歳～34歳、人工死産では20歳～24歳が最多となっている。



資料) 厚生労働省「人口動態統計」




(2) 本県の乳児死亡率は前年より1.0ポイント減少、新生児死亡率は0.3ポイント減少


令和5年の本県の乳児死亡数は18人、また、新生児死亡数は7人で、乳児死亡数は13人減少し、新生児死亡数は4人減少した。乳児死亡率は、全国は1.8で前年と同様、本県は1.6で前年から1.0ポイント減少した。また、新生児死亡率は、全国は0.8で前年から横ばい、本県は0.6で前年から0.3ポイント減少した。

本県の乳児死亡数を死因別にみると、「周産期に発生した病態」が5人で最多であった。

乳児死亡率と新生児死亡率の年次推移



主な死因別乳児死亡数年次比較(R4-R5)




資料) 厚生労働省「人口動態統計」

死亡数
(人)

乳児死亡の年次推移(熊本県)

死亡率
(出生千対)




資料) 厚生労働省「人口動態統計」

死亡数
(人)

新生児死亡の年次推移(熊本県)

死亡率
(出生千対)




資料) 厚生労働省「人口動態統計」

死亡数
(人)

早期新生児死亡の年次推移(熊本県)

死亡率
(出生千対)




資料) 厚生労働省「人口動態統計」

(3) 周産期死亡率は、2.9で、前年より0.9ポイント減少

本県の令和4年の周産期死亡数は35人（妊娠満22週以後の死産数28人、早期新生児死亡数7人）であり、周産期死亡率は2.9で前年より0.9ポイント減少し、全国より0.4ポイント低い値であった。

出産前後の死亡は、母体の健康状態に強く影響されやすいことから、出生をめぐる死亡として周産期死亡を観察している。平成6年までは、「妊娠第28週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたもの」を周産期死亡とし、通常出生千対の率で算出していたが、平成7年からICD-10を適用したことに伴い、周産期死亡を「妊娠満22週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたもの」とし、周産期死亡率の算出の分母を「出生数+妊娠満22週以後の死産数」にすることとなった。



資料) 厚生労働省「人口動態統計」