令和8年度　いもち病感染好適条件（BLASTAM)判定結果

発生指標	●	:好適条件	1	:準好適条件1	2	:準好適条件2	3	:準好適条件3	4	:準好適条件4
	－	:好適条件無	？	:判定不能						

・好適条件（いもち病の感染に好適な気象条件）

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間（22～25度）～17時間（15度）、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件（好適条件に準ずる気象条件）

準好適条件**1**：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。（前日までの**気温が低い**）

準好適条件**2**：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。（前日までの**気温が高い**）

準好適条件**3**：湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。（当日の**気温が不適**）

準好適条件**4**：湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。（当日の**湿潤時間が短い**）

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風（葉面が乾く）や、時間雨量3㎜を越える雨（胞子が雨で流される。）があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合があ
また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出ても小さな病斑しかでない。

	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
4/1	3	3	3	－	3	3	3	3	－	3	3	－	3	3	3	3	3
4/2	3	－	3	－	－	3	3	－	－	3	3	3	3	3	3	－	－
4/3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/4	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/5	3	3	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	3	－	－	－
4/6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/8	－	?	－	－	?	－	?	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
4/12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/13	－	－	4	3	－	4	3	3	4	3	4	4	1	3	－	－	－
4/14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－
4/15	1	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	1	1	1	1	－
4/16	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/19	1	3	1	4	－	1	－	3	1	1	1	1	1	1	1	1	－
4/20	4	－	4	4	－	4	－	3	－	4	1	4	1	4	－	3	－
4/21	－	－	－	－	－	－	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/23	3	3	－	－	－	－	3	－	－	4	－	－	－	4	－	－	－
4/24	－	－	－	3	－	3	－	－	－	3	－	－	3	4	1	1	4
4/25	3	3	3	3	3	－	3	3	3	－	3	－	3	3	3	－	－
4/26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4/30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	－	－	－	3
5/1																	
5/2																	
5/3																	
5/4																	
5/5																	
5/6																	
5/7																	
5/8																	
5/9																	
5/10																	
5/11																	
5/12																	
5/13																	
5/14																	
5/15																	
5/16																	
5/17																	
5/18																	
5/19																	
5/20																	
5/21																	
5/22																	
5/23																	
5/24																	
5/25																	
5/26																	
5/27																	
5/28																	
5/29																	
5/30																	
5/31																	

令和8年度　いもち病感染好適条件（BLASTAM)判定結果

発生指標	●	:好適条件	1	:準好適条件1	2	:準好適条件2	3	:準好適条件3	4	:準好適条件4
	ー	:好適条件無	？	:判定不能						

・好適条件（いもち病の感染に好適な気象条件）

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間（22～25度）～17時間（15度）、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件（好適条件に準ずる気象条件）

準好適条件**1**：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。（前日までの**気温が低い**）

準好適条件**2**：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。（前日までの**気温が高い**）

準好適条件**3**：湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。（当日の**気温が不適**）

準好適条件**4**：湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。（当日の**湿潤時間が短い**）

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風（葉面が乾く）や、時間雨量3㎜を越える雨（胞子が雨で流される。）があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合があ
また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出ても小さな病斑しかでない。

	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
6/1																	
6/2																	
6/3																	
6/4																	
6/5																	
6/6																	
6/7																	
6/8																	
6/9																	
6/10																	
6/11																	
6/12																	
6/13																	
6/14																	
6/15																	
6/16																	
6/17																	
6/18																	
6/19																	
6/20																	
6/21																	
6/22																	
6/23																	
6/24																	
6/25																	
6/26																	
6/27																	
6/28																	
6/29																	
6/30																	
7/1																	
7/2																	
7/3																	
7/4																	
7/5																	
7/6																	
7/7																	
7/8																	
7/9																	
7/10																	
7/11																	
7/12																	
7/13																	
7/14																	
7/15																	
7/16																	
7/17																	
7/18																	
7/19																	
7/20																	
7/21																	
7/22																	
7/23																	
7/24																	
7/25																	
7/26																	
7/27																	
7/28																	
7/29																	
7/30																	
7/31																	

令和8年度　いもち病感染好適条件（BLASTAM)判定結果

発生指標	●	:好適条件	1	:準好適条件1	2	:準好適条件2	3	:準好適条件3	4	:準好適条件4
	ー	:好適条件無	？	:判定不能						

・好適条件（いもち病の感染に好適な気象条件）

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間（22～25度）～17時間（15度）、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件（好適条件に準ずる気象条件）

準好適条件**1**：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。（前日までの**気温が低い**）

準好適条件**2**：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。（前日までの**気温が高い**）

準好適条件**3**：湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。（当日の**気温が不適**）

準好適条件**4**：湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。（当日の**湿潤時間が短い**）

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風（葉面が乾く）や、時間雨量3㎜を越える雨（胞子が雨で流される。）があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合があ
また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出ても小さな病斑しかでない。

	鹿北	南小国	岱明	菊池	阿蘇乙姫	熊本	南阿蘇	高森	三角	甲佐	松島	本渡	八代	水俣	人吉	上	牛深
8/1																	
8/2																	
8/3																	
8/4																	
8/5																	
8/6																	
8/7																	
8/8																	
8/9																	
8/10																	
8/11																	
8/12																	
8/13																	
8/14																	
8/15																	
8/16																	
8/17																	
8/18																	
8/19																	
8/20																	
8/21																	
8/22																	
8/23																	
8/24																	
8/25																	
8/26																	
8/27																	
8/28																	
8/29																	
8/30																	
8/31																	
9/1																	
9/2																	
9/3																	
9/4																	
9/5																	
9/6																	
9/7																	
9/8																	
9/9																	
9/10																	
9/11																	
9/12																	
9/13																	
9/14																	
9/15																	
9/16																	
9/17																	
9/18																	
9/19																	
9/20																	
9/21																	
9/22																	
9/23																	
9/24																	
9/25																	
9/26																	
9/27																	
9/28																	
9/29																	
9/30																	