

予想されるトビイロウンカの防除適期(7/15現在)

★JPPネットによる有効積算温度計算シミュレーションver2を使用

★7月7日飛来の場合(熊本県農業研究センター設置の予察灯における飛来日から推定)

地点名	熊本	三角	岱明	鹿北	菊池	阿蘇乙姫	甲佐	八代	水俣	人吉	本渡
1回目 防除適期 第1世代幼虫 (1齢～5齢)	7月22日 ～ 8月1日	7月24日 ～ 8月4日	7月22日 ～ 8月2日	7月24日 ～ 8月4日	7月24日 ～ 8月4日	7月27日 ～ 8月9日	7月24日 ～ 8月4日	7月24日 ～ 8月4日	7月24日 ～ 8月4日	7月24日 ～ 8月4日	7月24日 ～ 8月4日
2回目 防除適期 第2世代幼虫 (1齢～5齢)	8月18日 ～ 8月29日	8月21日 ～ 9月1日	8月19日 ～ 8月30日	8月23日 ～ 9月4日	8月22日 ～ 9月3日	8月31日 ～ 9月15日	8月22日 ～ 9月3日	8月21日 ～ 9月1日	8月22日 ～ 9月3日	8月22日 ～ 9月3日	8月22日 ～ 9月3日

注1) 今後の気象条件によって、**防除適期は随時変動する。**

注2) 7月14日までは2026年実測の平均気温、7月15日以降は平年の平均気温をもって有効積算温度にて試算した。

注3) 各地点のアメダスデータ平均気温(本年値及び平年値)をもとに、有効積算温度により発育ステージを予測した。

注4) 防除を行う場合は、**薬剤の効果が高い若齢幼虫期(1～2齢)**を狙って防除する。

ステージ	有効積算温度(日度)	発育0点(℃)	備 考
成虫	125	12	産卵までの期間
卵	135	11.4	孵化までの期間
幼虫	250	6.5	1齢～5齢幼虫の期間

(参考) トビイロウンカの発生時期別要防除水準

発生時期	要防除水準(成幼虫)
7月中旬～8月上旬	20頭／100株
8月中旬～8月下旬	100頭／100株
収穫30日前	300頭／100株