

<2026>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果 (8/12 現在) 果樹用

地点名	本年(R8)		平年 (過去10年の平均)		平年差	
	第6世代	第7世代	第6世代	第7世代	第6世代	第7世代
熊本	8月11日	8月27日	8月14日	9月1日	3日早い	5日早い
三角	8月15日	9月1日	8月19日	9月6日	4日早い	5日早い
本渡	8月18日	9月5日	8月24日	9月12日	6日早い	7日早い
八代	8月14日	8月31日	8月17日	9月3日	3日早い	3日早い
水俣	8月14日	8月31日	8月19日	9月5日	5日早い	5日早い

2 設定条件

計算期間	2026年 1月 1日 ~2026年 10月 31日					
アメダス地点	熊本・三角・本渡・八代・水俣					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値 (8/12 ~)					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度