

<2026>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果 (9/2 現在) 茶樹用

地点名	本年(R8)		平年 (過去10年の平均)		平年差	
	第7世代	第8世代	第7世代	第8世代	第7世代	第8世代
鹿北	9月14日	10月11日	9月20日	10月14日	6日早い	3日早い
菊池	9月4日	9月25日	9月8日	9月29日	4日早い	4日早い
甲佐	9月8日	9月30日	9月9日	10月1日	1日早い	1日早い
水俣	8月31日	9月19日	9月5日	9月26日	5日早い	7日早い
上	9月9日	10月3日	9月15日	10月9日	6日早い	6日早い

※平年は2016年～2025年の実測値平均

2 設定条件

計算期間	2026年 1月 1日 ～2026年 10月 31日					
アメダス地点	鹿北・菊池・甲佐・水俣・上					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値 (9/2 ～)					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度