

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

茶樹用

地点名	本年(R8)		平年 (過去10年の平均)		平年差	
	第8世代	第9世代	第8世代	第9世代	第8世代	第9世代
鹿北	10月10日		10月14日		4日早い	
菊池	9月24日	10月26日	9月29日		5日早い	
甲佐	9月29日		10月1日		2日早い	
水俣	9月19日	10月13日	9月26日		7日早い	
上	10月1日		10月9日		8日早い	

2 設定条件

計算期間	2026年 1月 1日 ～2026年 10月 31日					
アメダス地点	鹿北・菊池・甲佐・水俣・上					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値（ 9/30～ ）					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度	
8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度	