「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第4号

令和8年（2026年）11月5日

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/257846.html

長洲ブイ水温	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4
10年平均値	21.6	21.3	21.1	21.0	20.9
R8年度	21.8	21.8	21.8	21.8	21.7

分析：熊本県水産研究センター
協力：熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻（熊本） 17:25 窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (σ15)	珪藻類 細胞数/mL	採水 月日	採水 時刻	参考：窒素量 11年平均値※（11月上旬）	参考：窒素量 第3号（10/27）	備考
有明海	荒　尾	支柱	8.8	0.6	21.8	23.5	400	11/4	15:20	7.0	欠測	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	7.1	欠測	
	熊本北部	支柱	12.0	0.8	18.9	23.3	30		7:40	7.0	8.9	
		ベタ	8.6	0.5	22.1	23.7	100		7:45	9.6	欠測	
	岱　明	支柱	11.8	0.8	－	23.7	40		8:38	6.8	7.0	
		ベタ	8.2	0.5	－	23.9	10		8:31	7.3	5.5	
	滑　石	支柱	37.9	1.5	20.4	18.8	10		7:50	10.6	11.6	
		ベタ	7.9	0.5	22.8	23.6	20		8:00	5.6	5.9	
	河　内	支柱	7.8	0.7	21.7	24.1	130		6:58	11.1	14.7	
		ベタ	8.6	0.6	22.0	24.1	80		6:52	6.6	3.3	
	松　尾	支柱	82.2	3.1	19.6	16.9	60		10:00	12.0	欠測	
		ベタ	43.0	1.4	20.6	21.7	2,100		12:00	19.3	欠測	
	沖　新	支柱	24.2	0.9	21.1	21.5	30	11/3	－	8.5	欠測	
		ベタ	21.5	0.9	21.4	21.8	80		－	5.9	欠測	
	畠　口	支柱	37.1	1.5	19.0	19.8	30	11/4	8:50	7.0	欠測	
		ベタ	11.5	0.7	21.1	23.1	610		9:10	5.3	欠測	
	網　田	支柱	35.9	1.5	19.6	20.2	30		7:51	8.8	5.4	
		ベタ	25.0	1.0	19.4	21.5	90		7:38	6.3	3.9	
	平均	支柱	29.2	1.3	20.1	21.3				8.8	9.1	
		ベタ	16.1	0.7	21.3	23.1				8.1	4.9	
		全体	23.1	1.0	20.7	22.1				8.4	7.8	
八代海	三　角	支柱	1.8	0.3	21.7	23.5	80	11/4	15:20	5.7	欠測	
	平均	全体	1.8	0.3	21.7	23.5				5.7	－	
熊本県	平均	支柱	26.1	1.2	20.3	21.5				8.5	9.1	
		ベタ	16.1	0.7	21.3	23.1				8.1	4.9	
		全体	21.8	1.0	20.8	22.2				8.3	7.8	

※期待値は、窒素量　7以上　、リン量　0.5以上
珪藻類：キートセロス属、スケレトネマ属等
沖新は採水日が異なるため窒素量とリン量は平均の算出から除外しています。

※10年平均値は平成28年度から令和7年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度と令和6年度から令和7年度の6年平均、沖新は令和3年度から令和7年度の4年平均とする。
また、滑石は調査地点が大浜の調査地点に近接しているため大浜の10年平均とする。



