「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第5号

令和8年（2026年）11月10日

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html

長洲ブイ水温	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9
10年平均値	20.6	20.5	20.3	20.4	20.3
R8年度	21.5	21.2	20.5	20.0	19.9

分析：熊本県水産研究センター
協力：熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻（熊本） 8:44							参考：窒素量		備考
			窒素量 μg･at/L	リン量 μg･at/L	水温 ℃	比重 (σ15)	珪藻類 細胞数/mL	採水 月日	採水 時刻	10年平均値※ (11月上旬)	第4号 (11/5)	
有明海	荒尾	支柱	9.6	0.7	20.1	23.5	80	11/9	9:10	7.0	8.8	
		ベタ	－	－	－	－	－		－	7.1	欠測	
	熊本北部	支柱	10.3	0.7	20.1	23.3	90		8:55	7.0	12.0	
		ベタ	10.3	0.7	20.2	23.4	100		9:10	9.6	8.6	
	岱明	支柱	8.6	0.6	20.7	23.7	260		8:46	6.8	11.8	
		ベタ	8.1	0.4	20.1	23.4	410		8:37	7.3	8.2	
	滑石	支柱	13.1	0.8	19.4	22.7	890		8:40	10.6	37.9	
		ベタ	7.5	0.4	20.2	23.5	450		8:30	5.6	7.9	
	河内	支柱	16.9	0.9	18.8	22.5	260		8:10	11.1	7.8	
		ベタ	14.9	0.8	19.0	22.7	310		8:18	6.6	8.6	
	松尾	支柱	29.3	0.7	18.9	22.2	380		7:00	12.0	82.2	
		ベタ	22.4	0.6	18.9	21.7	150		7:00	19.3	43.0	
	沖新	支柱	14.2	0.7	19.6	22.6	250		－	8.5	24.2	
		ベタ	8.6	0.5	20.4	23.7	270		－	5.9	21.5	
	畠口	支柱	9.2	0.7	20.3	23.6	180		8:50	7.0	37.1	
		ベタ	6.2	0.5	21.2	24.2	290		9:03	5.3	11.5	
	網田	支柱	9.1	0.6	20.1	24.0	330		8:56	8.8	35.9	
		ベタ	6.5	0.5	21.5	24.3	30		8:43	6.3	25.0	
	平均	支柱	13.4	0.7	19.8	23.1				8.8	29.2	
		ベタ	10.6	0.5	20.2	23.3				8.1	16.1	
		全体	12.0	0.6	20.0	23.2				8.4	23.1	
八代海	三角	支柱	0.2	0.0	19.2	23.2	730	11/9	8:40	5.7	1.8	
	平均	全体	0.2	0.0	19.2	23.2				5.7	1.8	
熊本県	平均	支柱	12.0	0.6	19.7	23.1				8.5	26.1	
		ベタ	10.6	0.5	20.2	23.3				8.1	16.1	
		全体	11.4	0.6	19.9	23.2				8.3	21.8	

※期待値は、窒素量　7以上　、リン量　0.5以上
有明海の珪藻類はキートセロス属、スケレトネマ属等、八代海の珪藻類はタラシオシラ属が優先

※10年平均値は平成28年度から令和7年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度と令和6年度から令和7年度の6年平均、沖新は令和3年度から令和7年度の4年平均とする。
また、滑石は調査地点が大浜の調査地点に近接しているため大浜の10年平均とする。



