「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第6号

令和8年（2026年）11月17日

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html

長洲ブイ水温	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16
10年平均値	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2
R8年度	19.3	19.3	19.4	19.5	19.9

分析：熊本県水産研究センター
協力：熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻（熊本） 12:42							参考：窒素量		備考（アカシオサングイネア細胞数/mL）
			窒素量 μg･at/L	リン量 μg･at/L	水温 ℃	比重 （σ15）	珪藻類 細胞数/mL	採水 月日	採水 時刻	10年平均値※（11月中旬）	第5号（11/10）	
有明海	荒　尾	支柱	8.6	0.7	20.1	22.9	210	11/16	11:25	7.7	9.6	6
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	6.1	－	
	熊本北部	支柱	8.3	0.8	19.6	23.2	300		13:30	8.0	10.3	6
		ベタ	8.0	0.7	20.2	23.4	350		13:40	9.1	10.3	6
	岱　明	支柱	7.2	0.6	21.3	23.7	380		13:57	7.9	8.6	3
		ベタ	6.1	0.5	21.1	23.8	470		13:47	6.0	8.1	3
	滑　石	支柱	6.2	0.5	20.9	23.5	1,100		12:45	14.1	13.1	
		ベタ	6.2	0.5	21.0	23.9	390		12:55	6.4	7.5	
	河　内	支柱	12.5	2.5	19.5	21.4	620		11:25	14.4	16.9	120
		ベタ	12.8	0.6	19.8	21.7	900		11:32	8.4	14.9	30
	松　尾	支柱	127.7	2.1	18.9	18.7	70		8:00	33.5	29.3	1,900
		ベタ	17.3	0.7	17.4	20.6	650		8:15	22.1	22.4	
	沖　新	支柱	14.2	0.6	19.2	22.0	440		－	10.9	14.2	10
		ベタ	35.5	0.2	18.7	20.6	510		－	9.6	8.6	
	畠　口	支柱	10.0	0.6	20.6	22.5	540		13:05	10.3	9.2	
		ベタ	8.2	0.5	21.3	22.9	720		13:15	6.7	6.2	
	網　田	支柱	7.9	0.6	19.4	23.7	440	11/14	11:32	9.7	9.1	
		ベタ	6.0	0.5	21.6	24.2	90		11:24	8.8	6.5	
	平均	支柱	9.6	0.9	20.2	22.7				12.9	13.4	
		ベタ	12.8	0.5	20.4	22.7				9.3	10.6	
		全体	11.1	0.7	20.3	22.7				11.1	12.0	
八代海	三　角	支柱	0.4	0.0	20.3	22.9	1,200	11/16	13:00	7.1	0.2	
	平均	全体	0.4	0.0	20.3	22.9				7.1	0.2	
熊本県	平均	支柱	8.4	0.8	20.2	22.8				12.4	12.0	
		ベタ	12.8	0.5	20.4	22.7				9.3	10.6	
		全体	10.3	0.7	20.3	22.7				10.9	11.4	

※期待値は、窒素量　7以上　、リン量　0.5以上
有明海の珪藻類はキートセロス属、スケレトネマ属等、八代海の珪藻類はタラシオシラ属が優先
※網田、松尾は採水日、採水時刻が異なるため窒素量とリン量は平均の算出から除外しています。

※10年平均値は平成28年度から令和7年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度と令和6年度から令和7年度の6年平均、沖新は令和3年度から令和7年度の4年平均とする。
また、滑石は調査地点が大浜の調査地点に近接しているため大浜の10年平均とする。



